



Provokeret abort

- kirurgisk indgreb



CFR hospitaler

Ifølge gældende lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af 11. graviditetsuge. Provokeret abort kan foregå enten som medicinsk abort eller kirurgisk ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen. Medicinsk abort anbefales især før 9. graviditetsuge, mens kirurgisk abort ofte foretrækkes fra 9. til 11 fulde uger.

FØR OPERATIONEN

I forbindelse med forundersøgelsen foretages gynækologisk undersøgelse med ultralydskanning til bestemmelse af graviditetslængden. Sammen med gynækologen aftaler du, hvilken metode der er bedst egnet for dig. Anmodning om svangerskabsafbrydelse underskrives.

OPERATIONEN

Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse, og der gives medicin, som trækker livmoderen sammen. Lægen udvider livmoderhalsen og fører et plastrør ind i livmoderen. Derefter bliver graviditeten suget ud. Hele indgrebet varer cirka 10 minutter.

EFTER OPERATIONEN

Efter indgrebet køres du til sengeafsnittet, hvor du overvåges, indtil du er klar til at blive afhentet, normalt efter få timer. Du får smertestillende medicin med hjem til de første tre dage efter operationen. Når du har været i fuld bedøvelse, må du ikke selv køre bil hjem,


og du skal være under voksent opsyn det første døgn. Inden hjemsendelsen vil du blive orienteret af kirurgen om operationen og den efterfølgende plan. Samtidig får du en kopi af journalen udleveret, eller den vil blive sendt til dig efterfølgende.

Der kan være lette smerter og blødning efter indgrebet. Det er normalt, at du bløder svarende til en normal menstruation i cirka en uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne med at bløde i 2-3 uger.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan ses i sjældne tilfælde.

En anden sjælden komplikation er, at der under operationen kan gå hul på livmoderen. Denne komplikation kan bevirke, at der skal foretages en kikkertoperation eller, at du må blive på hospitalet ½-1 døgn til observation for blødning eller infektion.



FORHOLDSREGLER

Efter et par dage kan du genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion og lignende.

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du så længe du bløder:

- undgår ubeskyttet samleje
- undgår karbad, havbad, spa og svømmehal
- anvender hygiejnebind fremfor tamponer

Hvis du oplever:

- kraftig blødning
- feber over 38 grader
- kraftige underlivssmerter

skal du kontakte CFR Hospitaler, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at ringe til CFR Hospitaler.





Udarbejdet af Connie Palle
Sidst revideret februar 2015
Revideres igen i 2018