



INJEKTION MED BINYREBARKHORMON



CFR hospitaler

KORTFATTET BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Der foretages injektion af Binyrebarkhormon sammenblandet med lokal bedøvelse i sene, led eller slimsæk.

FØR INJEKTIONEN

Huden sprittes af, dette for at nedsætte risikoen for infektion med bakterier.

Lokalbedøvelsen er blandet sammen med Binyrebarkhormon.

Dette har 2 fordele:

1. bedøvelse af det injicerede område i 2-12 timer efter injektionen.
2. Såfremt smertelindrende effekt indtræder efter injektionen, skyldes dette i så fald lokal bedøvelsen. Dette kan være med til at bekræfte en mistænkt diagnose. Den smertelindrende effekt vil typisk indfinde sig allerede 10-15 minutter efter injektionen.

Det er meget uforudsigeligt om Binyrebarkhormon vil hjælpe på den enkelte patient, og såfremt det hjælper, er det meget usikkert hvor lang tid

der er effekt af injektionen. Hos nogle patienter er der kun effekt i 1 uges tid, hvorefter smerterne kommer igen, hos andre er der varig effekt.

INJEKTIONEN

Lægen afspritter hudområdet. Selve injektionen kan godt være smertefuld indtil lokalbedøvelsen virker.

EFTER INJEKTIONEN

Der er ca. 10% risiko for at du får flere smerter end du havde inden du fik injektionen. Dette på grund af at Binyrebarkhormon, indtil den positive anti-inflammatoriske, irritationshæmmende effekt indtræffer, kan have en irriterende effekt på vævet.

Dette sker normalt indenfor 1-2 døgn efter injektionen. Hvis du er uheldig at få øget smerten når lokal bedøvelseseffekten forsvinder, bør du behandle det med tablet Panodil 1 gram x 3-4 dagligt eller, hvis du kan tåle det, tablet Ibuprofen 400-600 mg x 3 dagligt indtil smerten forsvinder.

