

EFTERSTÆR




CFR hospitaler

INDLEDNING

Ved en grå stær operation efterlades en tynd membran, som man placerer den nye kunstige linse i. Denne membran kan i ca. 10% af tilfældene blive uklar i løbet af de kommende måneder til år. Hvis uklarhederne bliver af et sådant omfang, at de påvirker synet, kan man vælge at fjerne dem ved hjælp af laser-stråler. Dette er et smertefrit og kortvarigt indgreb, som ikke kræver bedøvelse.

FØR BEHANDLINGEN

Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige foranstaltninger. Der dryppes med pupiludvidende dråber ½ time før.

BEDØVELSE

Ikke nødvendig.

BEHANDLINGEN

Laser-strålen fokuseres på efterstæren og der "skydes" hul i membranen med en række skud.

EFTER BEHANDLINGEN

Du kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet. Der er ikke behov for efterbehandling, men en kontrol ca. 5-6 uger efter. Der kan være lidt fluer for øjet i et par uger.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Der kan en sjælden gang opstå nethindeløsning i efterforløbet, men risikoen anses ikke for større end ved den primære grå stær operation.

